

คำชี้แจงกรณี“ผู้เสียชีวิตจากการฉีดวัคซีนไขหวัดใหญ่ในประเทศเกาหลีใต้”

สำหรับประชาชน (ฉบับที่ 2)

สมาคมโรคติดเชื้อในเด็กแห่งประเทศไทย

มูลนิธิส่งเสริมการศึกษาไขหวัดใหญ่

วันที่ 3 พฤศจิกายน 2563

กระทรวงสาธารณสุขเกาหลีใต้ได้แถลงข่าว ณ วันที่ 31 ตุลาคม 2563 ว่าการสอบสวนผู้เสียชีวิตภายหลังได้รับวัคซีนไขหวัดใหญ่ในประเทศเกาหลีใต้ ซึ่งมีการใช้ไปแล้ว 17 ล้านโดส พบรายงานผู้เสียชีวิต 83 ราย และส่วนใหญ่เป็นผู้สูงอายุ ได้สอบสวนไปแล้ว 72 ราย ส่วนอีก 11 รายกำลังอยู่ในระหว่างรอผลการสอบสวน ผลการสืบสวนไม่พบว่ามี ความเกี่ยวข้องกับวัคซีนไขหวัดใหญ่ที่ฉีด แต่น่าจะเกี่ยวข้องกับโรคประจำตัวของผู้รับวัคซีน และพบว่าไม่มีวัคซีนของบริษัทผู้ผลิตใดที่มีอัตราผู้เสียชีวิตสูงกว่าของบริษัทอื่นๆ อย่างชัดเจน ยังคงแนะนำการฉีดวัคซีนป้องกันไขหวัดใหญ่ต่อไปโดยให้ใช้วัคซีน ได้ทุกชนิดของทุกบริษัท

วันที่ 1 พฤศจิกายน 2563 กระทรวงสาธารณสุขประเทศสิงคโปร์ ได้วิเคราะห์ข้อมูลและได้อนุญาตให้ใช้วัคซีน ไขหวัดใหญ่ Vaxigrip Tetra และ SKYCellflu ต่อไป โดยกล่าวว่าวัคซีนมีความปลอดภัย หลังจากระงับชั่วคราวตั้งแต่ 25 ตุลาคม 2563 เช่นเดียวกับประเทศมาเลเซีย ซึ่งได้ประกาศให้เริ่มใช้วัคซีนไขหวัดใหญ่ของทุกบริษัทต่อไปได้ในวันที่ 2 พฤศจิกายน 2563

วัคซีนไขหวัดใหญ่ที่ขึ้นทะเบียนจากทุกบริษัทที่ผลิตนั้นมีความปลอดภัยสูง ภายหลังฉีดอาจมีอาการเฉพาะที่เช่น ปวด บวม แดง ร้อน ได้บ้าง ซึ่งหายได้เองภายใน 1-2 วัน ส่วนอาการข้างเคียงรุนแรงพบได้น้อยมาก

สมาคมโรคติดเชื้อในเด็กแห่งประเทศไทย และมูลนิธิส่งเสริมการศึกษาไขหวัดใหญ่ ยังคงแนะนำให้ใช้วัคซีนไขหวัดใหญ่ต่อไป



(รองศาสตราจารย์ (พิเศษ) นพ.ทวี โชติพิทยสุนนท์)

นายกสมาคมโรคติดเชื้อในเด็กแห่งประเทศไทย

ประธานมูลนิธิส่งเสริมการศึกษาไขหวัดใหญ่